

NUEVA
PUBLICACION



PREVENCIÓN DE LESIONES CUTÁNEAS RELACIONADAS CON LA UTILIZACIÓN DE EPIs EN PROFESIONALES SANITARIOS

PREVALENCIA

52%

DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS HA DESARROLLADO LESIONES POR EPIs

NÚMERO

39-36%

1 LESIÓN

2 LESIONES

14% 3 LESIONES
2% 4 LESIONES
9% MÁS DE 4 LESIONES

ETIOLOGIA

74%

LESIONES POR PRESIÓN

11% LESIONES POR FRICCIÓN
9% LESIONES COMBINADAS
6% LESIONES POR HUMEDAD

EVOLUCIÓN MEDIA

12 DÍAS

LOCALIZACIÓN

79%

MEJILLAS

57-71%

NARIZ

MANOS 21%

LOS EPIs QUE GENERAN MÁS LESIONES/SÍNTOMAS SON MASCARILLAS, GAFAS Y PANTALLAS PROTECTORAS

RECOMENDACIONES

- RETIRAR LA MASCARILLA AL MENOS CADA 2 HORAS
- MANTENER LA PIEL LIMPIA
- MANTENER LA PIEL HIDRATADA
- **UTILIZAR AGHO EN LAS ZONAS DE RIESGO POR PRESION O FRICCIÓN**
- UTILIZAR APÓSITOS PARA MEJORAR LA ADAPTACIÓN DE LOS EPIs
- UTILIZAR PRODUCTOS BARRERA PARA EVITAR DERMATITIS IRRITATIVA



MEPENTOL®

MEPENTOL®
LECHE

ÁCIDOS GRASOS HIPEROXIGENADOS

(Únicos con Marca CE Clase IIb)

- *Prevención* DE LESIONES CUTÁNEAS, MANTIENEN LA PIEL EN CONDICIONES ÓPTIMAS
- *Tratamiento* DE LESIONES CUTÁNEAS EN ESTADIOS INICIALES, FACILITAN UNA RÁPIDA Y COMPLETA CICATRIZACIÓN
- *Mejora* DE LOS SÍNTOMAS ASOCIADOS

Torra-Bou J.E, et al. Incidencia, tipología y medidas de prevención y tratamiento de las lesiones cutáneas asociadas al uso de EPI en profesionales sanitarios durante la pandemia de COVID-19 en España. Estudio colaborativo GNEAUPP-Cátedra de estudios avanzados en heridas GNEAUPP – FSJJ – Universidad de Jaén. Gerokomos 2021; 1:32(1):32-42.

Rueda-López, J, et al. Prevención de las lesiones cutáneas relacionadas con la utilización de equipos de protección individual en profesionales sanitarios. Serie Documentos de Posicionamiento GNEAUPP nº 16. Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Logroño. 2020.