

5 DIFERENCIAS ENTRE...

LA PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS Y LA PÍLDORA ABORTIVA

(La píldora abortiva se conoce como aborto químico o farmacológico)

Todavía existen mitos erróneos relacionados con la píldora del día después. A menudo, se tiende a confundir la píldora del día después con la píldora abortiva cuando ambas son diferentes en el efecto que provocan en la mujer, mecanismo de acción, efectividad y prescripción o dispensación.

1. ¿CUÁNDO UTILIZAR CADA UNA?

PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS

- Relaciones sexuales sin protección
- Olvidos de la toma de la píldora habitual
- Incumplimiento de los plazos de colocación o retirada del anillo vaginal o el parche
- Rotura, retención o uso inadecuado del preservativo



PÍLDORA ABORTIVA

- Cuando la mujer, debidamente informada, solicita esta forma de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y no presenta contradicciones

2. OPCIONES DISPONIBLES

PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS

- Acetato de Ulipristal (ellaOne®) y Levonorgestrel (Norlevo®, Postinor® y genéricos)
- Retrasan la ovulación



PÍLDORA ABORTIVA

- La RU - 486 (mifeprestona) es una anti-progesterona que ocasiona la interrupción del embarazo

3. DISPENSACIÓN Y PRESCRIPCIÓN

PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS

- Se dispensa sin necesidad de receta en la farmacia



PÍLDORA ABORTIVA

- Se administra en centros sanitarios públicos o privados autorizados y acreditados por la Administración para la realización de interrupciones voluntarias de embarazo

4. ¿HASTA CUÁNDO USAR CADA UNA?

PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS

- ellaOne® es la única que ha demostrado una mayor eficacia en los días de máximo riesgo de embarazo.¹
- ellaOne® se puede utilizar hasta 120 horas después de una relación sin protección¹



PÍLDORA ABORTIVA

- 99% La RU-486 puede utilizarse para interrumpir el embarazo hasta el día 63 tras un embarazo confirmado aunque su eficacia es mayor hasta el día 49.²

5. EFECTOS SECUNDARIOS

PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS

- La píldora del día después no tiene apenas efectos secundarios graves. Los efectos son leves y transitorios: náuseas, dolor de cabeza, dolor abdominal y menstruación más dolorosa de lo habitual



PÍLDORA ABORTIVA

- Provoca sangrado, expulsión del saco embrionario, dolor y, en ocasiones, náuseas vómitos, hipertermia, cefalea, mareo (hipotensión) y diarrea