

CÁNCER DE OVARIO

EPIDEMIOLOGÍA Y SUPERVIVENCIA DEL CÁNCER DE OVARIO

1,6% La probabilidad general de una mujer de la Unión Europea de desarrollar cáncer de ovario en algún momento de su vida oscila entre un 0,64 y un 1,6%

50% La mitad de las mujeres a las que se les diagnostica cáncer de ovario tienen 60 años o más

90% del cáncer de ovario de tipo juvenil se produce antes de la pubertad

TIPOS DE CÁNCER DE OVARIO



90%
tumores epiteliales

10%
tumores no epiteliales

El cáncer de ovario es el séptimo tipo de cáncer más frecuente en las mujeres y es la séptima causa de muerte por tumor en las mujeres de todo el mundo.

FACTORES DE RIESGO

Edad



La edad media de las mujeres a las que se les diagnostica cáncer de ovario es de unos 60 años

Historial familiar



Hasta en un 10% de las mujeres con cáncer de ovario se ha observado una mutación genética heredada que puede ser la causa del tumor.


Mutaciones BRCA1 y BRCA2

Las mujeres con la mutación del gen BRCA1 o BRCA2 tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de ovario en algún momento de su vida

Maternidad



Las mujeres que no tienen hijos tienen un riesgo dos veces superior a desarrollar cáncer de ovario que las mujeres que sí los han tenido



PROGRESIÓN

ESTADIO I

El cáncer está localizado en el ovario (u ovarios) o en la(s) trompa(s) de Falopio, y no se ha extendido a otros tejidos

ESTADIO II

El tumor se encuentra en uno o ambos ovarios o en las trompas de Falopio y se ha extendido a otros órganos dentro de la pelvis

ESTADIO III

El cáncer puede haberse extendido o no a otros órganos cercanos, pero sí se ha propagado a los nódulos linfáticos o a la membrana que recubre el abdomen (el peritoneo)

ESTADIO IV

El cáncer se ha extendido al bazo, pulmones, hígado, u otros órganos fuera del abdomen

Referencias:

Cáncer de ovario: guía para pacientes - basada en la Guía de Práctica Clínica de la ESMO.